



Cytostatika hantering i hemsjukvård

När en patient behandlas eller har behandlats med cytotatika kan utsöndringstiden och graden av verksamt substans som utsöndras skilja sig åt. Den behandlande enheten ska informera om vilken typ av cytotatika som är aktuell. Se Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2005:5 (Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt.)

Peroral administrering

- Använd medicinsked vid uttag ur medicinburk.
- Skeden skall sköljas i rikligt med vatten efteråt.
- Tabletter och kapslar får ej delas eller krossas.
- Delas tabletter eller kapslarna upp i en dosett så ska separat dosett användas.
- Tabletter och kapslar ska sväljas med riklig mängd vätska

Avfallshantering i samband med cytotatikabehandling, Urin

- Vid byte av KAD-påse rekommenderas:
- Att använda DUBBLA handskar och långärmad rock.
- Töm påsen långt ner i toalettstolen med så lite stänk som möjligt.
- Stäng locket och spola.
- Släng KAD-påsen i dubbla soppåsar och lägg i vanliga sopor/säckar.

Inkontinensskydd

- Vid användning av inkontinensskydd släng dessa i dubbla soppåsar.

Bäcken

- Vid användning av bäcken/urinflaska låt urinen svalna och därefter håll den i toaletten, stäng locket och spola. Det är bara varm urin eller ånga från den som kan utsöndra läkemedlet.



Toalettbesök

- Person som går på toalett på vanligt sätt ska stänga locket och spola 2 gånger.

Spill

- Torka upp eventuellt spill med absorberande engångsmaterial. Undvik svepande rörelser. Tvätta med vatten och därefter ytdesinfektionsmedel. Använt engångsmaterial läggs i dubbla soppåsar som försluts och läggs i vanliga sopsäckar.

Tvätt

- Skyddsrockar och andra textilier som förorenats hanteras som vanlig tvätt.

På oskyddad hud

- Skölj genast i riklig mängd vatten i 5 min. Om irritation uppstår kontakta läkare. Dokumentera tillbud.

I ögon

- Skölj genast i riklig mängd vatten i 15 min. Om irritation uppstår kontakta läkare. Dokumentera tillbud.

Kontakta ansvarig sjuksköterska om något är oklart.